

บทที่ 3 หน่วยทางเคมี  
(Unit of Chemistry)

วัตถุประสงค์

1. หน่วยน้ำหนัก
2. หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย
3. สามารถเตรียมสารละลายจากสารของแข็งหรือของเหลวที่ความเข้มข้นต่างๆได้



★ หน่วยน้ำหนัก ★

1. น้ำหนักอะตอม คือน้ำหนักของธาตุต่างๆ ที่มีจำนวนอะตอมเท่ากับ  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว ★  
 $6.02 \times 10^{23}$  คือ เลขอโวกาโด (Avogadro's number)  
 Na จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนักเท่ากับ  กรัม

273เคลวิน  
0°เซลเซียส  
32°ฟาเรนไฮต์

สำหรับธาตุที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนใช้โดยปกติจะใช้ขีดจำกัดสองเลขโดดมาวาง

http://shawaphon.files.wordpress.com/2011/08/e0b895e0b8b2e0b8a3e0b87e0b898e0b8b2e0b895e0b8b8-e0b894e0b8a1e0b88e0b897e0b8a3e0b8b2e0b89a.png



- Cl จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนักเท่ากับ  กรัม
- K จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนักเท่ากับ  กรัม
- Al จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนักเท่ากับ  กรัม
- P จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนักเท่ากับ  กรัม

## ★ 2. กรัมอะตอม

คือ หน่วยน้ำหนักของธาตุ 1 กรัมอะตอม จะมีค่าเท่ากับน้ำหนักอะตอมของธาตุนั้น

$$\text{no. gaw} = \frac{\text{น้ำหนักสาร (g)}}{\text{น้ำหนักอะตอม}}$$

ซังอะลูมิเนียมมา 12.0456 กรัม มีน้ำหนักกรัมอะตอมเท่าไร

ซังทองแดงมา 25.0020 กรัม มีน้ำหนักกรัมอะตอมเท่าไร

5

## ★ 3. น้ำหนักโมเลกุล

$\text{O}_2$  จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนักเท่ากับ  กรัม

$\text{H}_2$  จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนักเท่ากับ  กรัม

$\text{NaOH}$  จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนักเท่ากับ  กรัม

$\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$  จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนักเท่ากับ  กรัม

6

## ★ 4. กรัมโมเลกุล (mole)

คือ น้ำหนักที่ได้จากการนำน้ำหนักของอะตอมแต่ละธาตุในโมเลกุลมารวมกัน

$$\text{no. mole} = \frac{\text{น้ำหนักสาร (g)}}{\text{น้ำหนักโมเลกุล}}$$

$$\text{no. m mole} = \frac{\text{น้ำหนักสาร (mg)}}{\text{น้ำหนักโมเลกุล}}$$

7

## ★ 5. น้ำหนักสูตร

คือ น้ำหนักของสารต่าง ๆ ที่มีจำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว ซึ่งสามารถคิดได้จากน้ำหนักอะตอมของธาตุต่าง ๆ ในสูตรเคมีของสารประกอบนั้น ๆ มารวมกัน เช่น

$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนัก = 126.066 กรัม

$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  จำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  ตัว มีน้ำหนัก = 381.372 กรัม

8

## ★ 6. กรัมน้ำหนักสูตร

คือ หน่วยน้ำหนักของสารประกอบที่ 1 กรัมน้ำหนักสูตรจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักสูตรของสารประกอบนั้น ๆ

$$\text{no. gfw} = \frac{\text{น้ำหนักสาร (g)}}{\text{น้ำหนักสูตร}}$$

9

## ★ 7. น้ำหนักสมมูล

คือ น้ำหนักสูตรหารด้วยเลขออกซิเดชัน (Oxidation state) ที่เปลี่ยนไปในปฏิกิริยารีดอกซ์ น้ำหนักสมมูลจะมีค่าเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาเป็นชนิดใด

$\text{H}_3\text{PO}_4$	น้ำหนักสมมูลเท่ากับ	32.67
$\text{H}_2\text{PO}_4$	น้ำหนักสมมูลเท่ากับ	48.50
$\text{HNO}_3$	น้ำหนักสมมูลเท่ากับ	63.00

10

## ★ 8. กรัมสมมูล

คือ หน่วยน้ำหนักของสารประกอบที่ 1 กรัมสมมูลจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักสมมูลของสารประกอบนั้น ๆ

$$\text{no. gmE} = \frac{\text{น้ำหนักสาร (g)}}{\text{น้ำหนักสมมูล (eq.wt)}}$$

11

## สรุป หน่วยน้ำหนัก

1. น้ำหนักอะตอม คู่กับ กรัมอะตอม
2. น้ำหนักโมเลกุล คู่กับ กรัมโมเลกุล (mole)
3. น้ำหนักสูตร คู่กับ กรัมน้ำหนักสูตร
4. น้ำหนักสมมูล คู่กับ กรัมสมมูล (สารละลายกรด)

12

## แบบฝึกหัด

1. จงหาน้ำหนักกรัมอะตอมของธาตุต่อไปนี้
  - 1.1 ชั่งทองคำ (Au) มา 0.2550 กรัม
  - 1.2 ชั่งเงิน (Ag) มา 2.2540 กรัม
  - 1.3 ชั่งทองแดง (Cu) มา 10.8200 กรัม
2. จงหาน้ำหนักกรัมโมเลกุล (mole) ของสารต่อไปนี้
  - 2.1 ชั่งสาร NaOH ( 40 g/mol) มา 2.00 กรัม
  - 2.2 ชั่งสาร KHP (204.28 g/mol) มา 0.1450 กรัม

13

## ★ หน่วยความเข้มข้น ★

### 1. โมลาร์ (Molarity : M)

คือ จำนวนโมลของสารประกอบที่มีอยู่ในสารละลาย ปริมาตร 1 ลบ.คม.หรือจำนวนมิลลิโมลของสารประกอบที่มีอยู่ในสารละลาย 1 ลบ.คม.

$$M = \frac{\text{no. mole}}{\text{dm}^3} = \frac{\text{no. mmole}}{\text{cm}^3}$$

14

### ตัวอย่างที่ 3.1

จงเตรียมสารละลาย  $\text{NH}_4\text{Cl}$  เข้มข้น 1.20 M ในปริมาตร 500 มล.

### ตัวอย่างที่ 3.2

จงเตรียมสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.50 M ในปริมาตร 250 มล.

### ตัวอย่างที่ 3.3

จงเตรียมสารละลาย KHP (MW 204.28 g/mole; %assay = 99.8%) เข้มข้น 2 M ในปริมาตร 100 มล.

15

### 2. โมแลล (molality)

คือ หน่วยความเข้มข้นที่แสดงในเทอมของจำนวนโมลของตัวถูกละลายต่อตัวทำละลายหนึ่งกิโลกรัม สารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นโมแลลิตี จะเรียกว่าสารละลายโมแลล (Molal solution)

$$m = \frac{n \text{ (จำนวนโมลของตัวถูกละลาย)}}{\text{Kg (กิโลกรัมของตัวทำละลาย)}}$$

16

### 3. ฟอर्मาลิตี (Formality, F)

คือ จำนวนกรัมน้ำหนักสูตรของสารที่มีอยู่ในสารละลาย ปริมาตร 1 ลบ.ดม. สารละลายที่มีความเข้มข้นเป็น ฟอर्मาลิตี จะเรียกว่าสารละลายฟอर्मอล (Formal solution)

$$F = \frac{\text{กรัมน้ำหนักสูตร}}{\text{ปริมาตร}}$$

17

### 4. นอร์มาลิตี (Normality, N)

คือ จำนวนกรัมสมมูลของสารละลาย 1 ลบ.ดม. หรือ จำนวนมิลลิกรัมสมมูลในสารละลาย 1 ลบ.ซม.

$$N = \frac{\text{no. gE}}{\text{dm}^3} = \frac{\text{no. mgE}}{\text{cm}^3}$$

18

#### ตัวอย่างที่ 3.4

จงเตรียมสารละลาย  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (MW .....g/mole) เข้มข้น 1.50 N ในปริมาตร 500 มล.

#### ตัวอย่างที่ 3.5

จงเตรียมสารละลาย  $\text{HNO}_3$  (MW .....g/mole) เข้มข้น 0.25 N ในปริมาตร 250 มล.

#### ตัวอย่างที่ 3.6

จงเตรียมสารละลาย  $\text{H}_3\text{PO}_4$  (MW .....g/mole) เข้มข้น 1.15 N ในปริมาตร 1000 มล.

19

### 5. ความเข้มข้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (Percentage concentration)

สามารถคิดได้ 3 แบบ

$$5.1 \text{ weight percent (w/w)} = \frac{\text{wt. of solute} \times 100}{\text{wt. of solution}}$$

$$5.2 \text{ volume percent (v/v)} = \frac{\text{volume of solute} \times 100}{\text{volume of solution}}$$

$$5.3 \text{ weight volume percent (w/v)} = \frac{\text{wt. of solute} \times 100}{\text{volume of solution}}$$

20

$$M = \frac{10xP(w/v)}{MW.}$$

$$M = \frac{10xP(w/w)d}{MW.}$$

เมื่อ  $d$  = ความหนาแน่นของสารละลาย

$$M = \frac{10xP(v/v)D}{MW.}$$

เมื่อ  $D$  = ความหนาแน่นของตัวถูกละลาย

21

### ตัวอย่างที่ 3.8

จงหาความเข้มข้นของกรดต่อไปนี้

(1)  $\text{HNO}_3$ ; 63.01 g/mole,  $d = 1.5129$  g/ml, 68%

(2)  $\text{HCl}$ ; 36.45 g/mole,  $d = 1.18$  g/ml, 38%

(3)  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ; 98.079 g/mole,  $d = 1.84$  g/ml, 98%



22

### ตัวอย่างที่ 3.9

จงเตรียมสารละลายแคลเซียมไอออน ( $\text{Ca}^{2+}$ ) เข้มข้น 0.15 M  
จาก  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  มวลโมเลกุลเท่ากับ 164.088 g/mol

AW. Ca = 40.08

AW. N = 14.01

AW. O = 15.99

### ตัวอย่างที่ 3.10

จงเตรียมสารละลายแบเรียมไอออน ( $\text{Ba}^{2+}$ ) เข้มข้น 1.50 M  
จาก  $\text{BaCl}_2$  มวลโมเลกุลเท่ากับ 208.23 g/mol

23

### 6. จำนวนส่วนในล้านส่วน (parts per million)

สำหรับสารที่เจือจางมาก ๆ จะใช้หน่วยความเข้มข้นเป็น  
จำนวนส่วนในล้านส่วน (ppm)

$$\text{ppm} = \frac{\text{wt. of solute} \times 10^6}{\text{wt. of solution}} = \text{mg/L}$$

$$\text{ppb} = \frac{\text{wt. of solute} \times 10^9}{\text{wt. of solution}} = \mu\text{g/L}$$

24

## ตัวอย่างที่ 3.11

เตรียมสาร 2.50 ppm : ชั่งสารมา 2.50 mg ละลายในตัว  
ทำละลาย 1 L

เตรียมสาร 25 ppm : ชั่งสารมา ....mg ละลายในตัว  
ทำละลาย 1 L

เตรียมสาร 100 ppm : ชั่งสารมา .... mg ละลายในตัว  
ทำละลาย 100 ml

เตรียมสาร 15 ppm : ชั่งสารมา ....mg ละลายในตัว  
ทำละลาย 250 ml

25

## ตัวอย่างที่ 3.12

เตรียมสาร 5 ppb : ชั่งสารมา 5 µg ละลายในตัว  
ทำละลาย 1 L

เตรียมสาร 3 ppb : ชั่งสารมา ....µg ละลายในตัว  
ทำละลาย 500 mL

เตรียมสาร 200 ppb : ชั่งสารมา .... µg ละลายในตัว  
ทำละลาย 100 ml

เตรียมสาร 5 ppb : ชั่งสารมา ....µg ละลายในตัว  
ทำละลาย 250 ml

26

## สรุปหน่วยความเข้มข้น

$$1. \text{ Molar (M)} = \frac{\text{mole}}{L} = \frac{\left(\frac{g}{MW}\right)}{1000 \text{ mL}}$$

$$2. \text{ Formality (F)} = \frac{gfw}{L} = \frac{\left(\frac{g}{fw}\right)}{L}$$

$$3. \text{ Normality (N)} = \frac{gE}{L} = \frac{\left(\frac{\frac{g}{MW}}{\text{oxidation}}\right)}{L}$$

27



## สรุปหน่วยความเข้มข้น

$$4. \%(\text{w/w}), \%(\text{w/v}), \%(\text{v/v})$$

$$5. \text{ ppm} = \frac{mg}{L} = \frac{10^{-3} g}{L}$$

$$6. \text{ ppb} = \frac{\mu g}{L} = \frac{10^{-6} g}{L}$$

28

 ส่วนใหญ่เราจะรู้จัก p – function ในรูปของ pH ซึ่ง   
จะหมายถึง  $-\log [\text{concentration}]$

▶  $\text{pX} = -\log[\text{X}]$  ★

▶  $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$  ★

▶  $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$  ★

29

ตัวอย่างที่ 3.13 จงคำนวณ p – function ของไอออนแต่ละชนิดในสารละลาย  $2.00 \times 10^{-6} \text{ M NaCl}$  และ  $3.50 \times 10^{-8} \text{ M HCl}$

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log[\text{H}^+] = -\log(3.50 \times 10^{-8}) \\ &= 8 - 0.54 = 7.456 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pNa} &= -\log[\text{Na}^+] = -\log(2.00 \times 10^{-6}) \\ &= 6 - 0.301 = 5.699 \quad \# \end{aligned}$$

30

สำหรับ  $\text{Cl}^-$  ต้องรวมความเข้มข้นของสารทั้งสองแล้วค่อย  
คำนวณหา p – function

$$[\text{Cl}^-] = 2.00 \times 10^{-6} \text{ M} + 3.50 \times 10^{-8} \text{ M} = \dots\dots\dots\text{M}$$

$$\text{pCl} = -\log[\text{Cl}^-] = -\log(\dots\dots\dots)$$

$$= \dots\dots\dots \quad \#$$

31

“ จบการบรรยาย ”

บทที่ 3

หน่วยทางเคมี

(Unit of Chemistry)

